

7.IV.27, 6 st. *Columba p. palumbus* 7.IV.27. *Fringilla coelebs*
 9.IV.27, flere sedda. *Mergus albellus* 10.IV.27, ♂ i sällskap med
 knipor. *Numenius a. arquata* 10.IV.27, hörts. *Aquila ch. chrysaetos*
 10.IV.27. *Vanellus vanellus* 11.IV.27, 1 ex. *Fulica a. atra* 12.IV.27,
 30 st. *Larus r. ridibundus* 12.IV.27, 100 st. *Emberiza s. schoe-
 niclus* 12.IV.27, ♂. *Anas c. crecca* 12.IV.27. *Nyroca f. ferina*
 12.IV.27, 4 st. *Megalornis g. grus* 12.IV.27, 1 ex. *Anas a. acuta*
 12.IV.27, 4 st. *Circus ae. aeruginosus* 14.IV.27, 1 ex. *Spatula c.
 clypeata* 15.IV.27. *Botaurus s. stellaris* 16.IV.27. *Tringa nebularia*
 16.IV.27. *Capella g. gallinago* 16.IV.27.

Kahlaajahavaintoja Tampereella ja sen lähistöllä (m. m. Hatanpään Karjusuolla) v. 1926.

YRJÖ H. AATINEN.

Vanellus vanellus. 1 kpl. 27. VI. *Charadrius hiaticula*. 1 kpl.
 24. V; 3 kpl. 31. VII; 2—3 kpl. 1—6. VIII. *Ch. dubius curonicus*.
 1 kpl. 7. VI. *Limicola falcinellus*. 1 kpl. 22—28. VII. lirojen ja sir-
 riäisten parissa. 24 p:nä äänsi se lentoon lähtiessään muuten sa-
 malla tavalla kuin kangassirräinen, mutta kovemmin ja matalammin,
 selvään lausuttuna trr-, jossa ei kuulunut suosirriäiselle ominaista
 yy-tä. 28 p:nä se huuteli (ukonilman lähestyessä) omituista kar-
 keata varoitushuutoaan rriit-rriiit-rriiit, lentoon lähtiessä jälleen
 trr-. *Calidris ferruginea*. 27. VIII. 1 kpl. komea koiras muiden
 sirriäisten joukossa; 28—29. VIII. 1 kpl., mutta se oli nyt joko naa-
 ras tai sitten nuori lintu, joka jälleen 31 p:nä. *Calidris alpina*. 12
 —18. VII. 1 kpl. (sama ilmaantumispäivä kuin v. 1925), 27. VII. 1
 kpl., 28. VII. 2 kpl. joka määrä 4—6. IX. *Calidris minuta*. 31. V.
 1 kpl., ainoa kahlaaja koko suolla; ei syksyllä. *C. temminckii*. 19
 V. 6—7 kpl., 20. V. 9—10 kpl., 21—22. V. 14—15 kpl., 23. V. 2
 kpl., 24. V. 5 kpl., 25. V. toistakymmentä, 26. V. 6 kpl.; 11—16.
 VII. 1 kpl., 21—23. VII. 1 kpl., 24—26. VII. 2—3 kpl., 27—31. VII.
 4—5 kpl., 1. VIII. 7—8 kpl., 2—9. VIII. 3—4 kpl., 11—15. VIII. 2—
 3 kpl., 19. VIII. 1 kpl., 22. VIII. 1 kpl., 23. VIII. 4—5 kpl., 25. VIII.
 3 kpl. ja 27. VIII. 4—5 kpl. *Calidris canutus*. 22. VII. 1 kpl. naa-
 ras (ilmaantumispäivä sama kuin vuosi 1925); itätuuli, joka myös

oli edellisenä iltana; 26. VII. 2 kpl., joista toinen koiras, tuulta kaakosta; 27. VII. 3 kpl.; 28—29. VII. 5 kpl., kaakkotuuli ainakin edellisenä päivänä; 30. VII. 12 kpl., itätuuli; 31. VII. 12—13 kpl., mikä luku myös 1. VIII; 2. VIII. 15 kpl., 3. VIII. 21—22 kpl., 4. VIII. n. 25 kpl.; 5—6. VIII. n. 15 kpl.; 9. VIII. yli 20 kpl.; 11. VIII. n. 25 kpl.; 12. VIII. 12—15 kpl.; 15. VIII. 15—16 kpl.; 17. VIII. n. 30 kpl.; 19. VIII. 16—17 kpl.; 22. VIII. yli 20 kpl., etelätuuli; 23. VIII. yli 25 kpl.; 25. VIII. 13 kpl.; 27. VIII. 16—17 kpl.; 28—31. VIII. 15 kpl.; 2. IX. n. 15 kpl., kovaa länsituulta; 4. IX. 11 kpl.; 5—6. IX. 12 kpl.; 8. IX. 9 kpl., kovaa, koleaa länsituulta; 10—12. IX. 6—7 kpl.; 14—17. IX. 6 kpl.; 19—23. IX. 4 kpl. — Keväällä en rantasirriäisiä nähnyt. — Silloin tällöin tapasin lintuja myös siinä lähellä Pyhäjärven rannalla. *Tringa erythropus*. 11. VI. 5 kpl. nousi suolta lentoon ääntäen selvästi t j ü i - t j ü i -suuntaan kaakko. 2. VII. 1 kpl.; 1. VIII. 3 kpl.; 3—4. VIII. 1 kpl.; 9. VIII. 1 kpl. *Tr. ochropus*. 25. IV. 1 kpl. Hatanpää, havumetsikön viereisessä vesilätäkössä; 1. V. usea kpl. tulvaniityn yllä Messukylän kirkon takamaalla; 23. V. 1 kpl. Sääksjärvi; 23. V. 1 kpl. metsälammen viereltä rajamailla Kangasala—Lempäälä; 11—17. VII. 1 kpl.; 18. VII. 2 kpl.; 20—31. VII. 1 kpl.; 1. VIII. 1 kpl.; 6. VIII. 1 kpl. *Tr. glareola*. 7. V. joku kpl.; 13. V. n. 5 kpl. ja Idesjärven yllä n. 20 kpl.; 14. V. n. 20 kpl. ja 9—10 kpl. Härmälän lammella; 15—16. V. joku kpl.; 17. V. n. 50 kpl.; 18—19. V. joku kpl.; 20—22. V. n. 10 kpl.; 23. V. joku kpl.; 25. V. 2 kpl.; 26. V. 1 kpl. ja 1 kpl. Härmälän lammella; 29. V. 2 kpl.; 25. VI. n. 10 kpl.; 27. VI. lähes 30 kpl.; 29—30. VI. 1 kpl.; 2. VII. 3 kpl.; 11—20. VII. n. tusina; 21—24. VII. n. 20 kpl.; 26. VII. n. 25 kpl.; 27—31. VII. 35—40 kpl.; 1—6. VIII. 35—40 kpl.; 8. VIII. 3 kpl. Pyhäjärven yllä Pitkäniemen kohdalla; 9—11. VIII. n. 20 kpl.; 12—15. VIII. tusina; 17. VIII. 12—15 kpl.; 19—22. VIII. n. 10 kpl.; 23. VIII. yli 20 kpl.; 25—27. VIII. 4—5 kpl.; 28. VIII. 1 kpl.; 29. VIII. 2 kpl.; 31. VIII. 1 kpl.; 26. IX. 1 kpl. *Tr. nebularia*. 17. V. 1 kpl.; 29. V. 1 kpl.; 27. VI. ääniä, 11. VII. 4 kpl.; 16. VII. 1 kpl.; 22. VII. 2 kpl.; 23. VII. ääniä; 26. VII. 1 kpl.; 30—31. VII. 1 kpl., mikä luku myös 1—2. VIII.; 3. VIII. 2 kpl.; 9—11. VIII. 1 kpl. *Tr. hypoleucos*. Harva se päivä tapasin useita lintuja syysmuuton aikana. Pesii lähiseudun joks. kaikkien metsäjärvien kivikkorannoilla, mutta esim. Lempäälän saaririkkaasta, kivikkorantaisesta Terväjärvestä se vallan puuttui, kun kiersin juhannuksena sen ympäri. *Philomachus pugnax*. 16—17. V. 2 kpl.; 19—20. V. 3—4 kpl.; 22—

23. V. 2—3 kpl.; 27. VI. 4 kpl., joista 2 koirasta, toinen musta, toinen ruostekellerväkauluksinen; 11. VII. 6—7 kpl.; 12. VII. 3—4 kpl.; 13—14. VII. 1—2 kpl.; 16—18. VII. 3—4 kpl.; 20—21. VII. 2—3 kpl.; 22. VII. 7—8 kpl.; 23. VII. 2 kpl.; 24—27. VII. n. 5 kpl.; 28. VII. 7—8 kpl.; 29. VII. joku kpl.; 30. VII. n. 10 kpl.; 31. VII. 6—7 kpl.; 1—5. VIII. 2—3 kpl. *Lymnocyptes minimus*. 12. V. nousi 1 kpl. lentoon Härmälän lammen rannalta; Karjusuolla 11. VII. 1 kpl., joka jälleen 16—18 päivinä. (Isotaivaanvuohi pesii tällä seudulla ja on muuttojen aikaan tavallinen).

Toimituksen lisäys. Olisi suotavaa että havaintojen tekijä vastaisuudessa koettaisi hankkia todistekappaleita harvinaisten lajien esiintymisestä sisämaassa, kuten *Limicola falcinellus*, *Calidris ferruginea*, *C. minuta*, *C. canutus*. (Vrt. myös O. F. 1926 siv. 17, jossa hra Aatisen L. Y:n mukaan mainitaan nähneen m. m. *C. maritima*'n ja *Crocethia alba*'n).

Zusammenfassung. Herr Aatinen berichtet über das Erscheinen der oben verzeichneten Arten in der Nähe von Tampere (Tammerfors). Man vergleiche auch O. F. 1926 S. 17. Es ist somit bewiesen, dass (hoch)nordische Arten wie *Limicola falcinellus*, *Calidris ferruginea*, *Calidris alpina*, *minuta*, *canutus*, *Lymnocyptes minimus* u. a. quer durch unser Land ziehen.



Lisää Käkisalmen ja sen ympäristön linnustosta. *Larus r. ridibundus* L. Jälkeen kesän —25, jolloin tein ensimmäisen havaintoni, on tullut naurulokki niin yleiseksi Vuoksella, että se viime kesänä oli yleisin loppilaji. Pesiä en löytänyt, koska en alkukesästä ollut seudulla.

Bubo b. bubo (L). Vielä aivan yleinen Suotniemen saloilla. Luulen, että useampia pareja pesii, sillä kesäoinä voi kuulla huhuntaa eri suunnilta.

Troglodytes t. troglodytes. (L). Tullut yhä yleisemmäksi. Kaksi pesää löysin. Yhden yksilön tapasin vielä 15. XI.