

Hailuodon lintuluettelo¹⁾

laatinut

EINARI MERIKALLIO.

Allamainittu luettelo perustuu vuosien 1902 ja 1924 välillä alussa vuosittain pienempiin Hailuodolle tehtyihin tutkimusmatkoihin sekä myöskin muutamien eri henkilöiden antamiin tietoihin.

1. **Corvus c. corax* L. Hyvin harvalukuinen pesimälintu.
2. **Corvus c. cornix* L. Tavallista yleisempi pesimälintu. Pesälöytöjä: 22. VI 1911 verrattain suuria poikasia, 31. V 1911 4 pientä poikasta ja yksi muna, 9. VI 24 2 puolikasvuista poikasta, 9. VI 24 3 puolikasvuista poikasta, 9. VI 24 pieniä poikasia, 17. VI 24 4 munaa. Kuten edelläolevista pesälöydöistä näkyy, munii varis jo toukokuussakin eikä, kuten Sandman on huomannut, vasta kesäkuussa.
3. () *Corvus f. frugilegus* L. Ilmoituksen mukaan tavattu Hailuodossa.
4. () *Colæus m. monedula* (L). Rydman'in ilmoitus naakan varemasta pesimisestä Hailuodon kirkkoon kaipaa vahvistusta.
5. () *Pica pica* (L). Sandman mainitsee, ettei harakkaa ole koskaan tavattu Hailuodolla. Myöhemmin on harakka kuitenkin muutamia kertoja nähty Hailuodossa, mutta pesiminen on toistaiseksi tuntematon.
6. () *Nucifraga caryocatactes* (L). 20 p. syyskuuta 1907 ampui maisteri Y. Hellman (Hellemaa) pähkinähakkisen.
7. **Sturnus v. vulgaris* L. Tämä Sandman'in aikaan tuntematon lintulaji pesi ensi kerran Hailuodossa v. 1913 (2 tai 3 paria). Myöhempi pesiminen epätietoinen.
8. **Chloris ch. chloris* (L). Kesällä 1916 tapasin tämän lajin kolme kertaa.
9. **Carduelis spinus* (L). Tavataan hyvin harvalukuisena.
10. **Carduelis l. linaria* (L). Jotensakin yleinen pesimälintu.
11. **Carduelis c. cannabina* (L). Pari tavattu 1—3. VII 1916.

¹⁾ Verzeichnis der auf Hailuoto (Karlö) im Bottnischen Meerbusen (65° n. Br) angetroffenen Vögel. * = Brutvogel. ↑↓ = Durchzügler. () = streichend oder unregelm. durchziehend.

12. **Pyrrhula p. pyrrhula* (L). Pesii hyvin harvalukuisena.
13. ↑↓ *Pinicola e. enucleator* (L). Tavataan muuttomattoilla.
14. **Loxia c. curvirostra* L. Pesinee Hailuodossa päättäen enemmän tai vähemmän epäsäännöllisestä esiintymisestä.
15. **Fringilla c. coelebs* L. Sangen runsaslukuinen kaikkialla, missä metsää kasvaa. Pesälöytöjä: 11. VI 24 4 vähän haudottua munaa, 11. VI 24 1 tuore muna, 11. VI 24 valmis pesä, 12. VI 24 5 haudottua munaa, 12. VI 24 4 tuoretta munaa, 26. VI 24 valmis pesä, 22. VI 24 1 tuore muna, 22. VI 5 munaa.
16. **Fringilla montifringilla* (L). Monta kertaa vähänlukuisempi edellistä lajia, mutta kuitenkin jotensakin yleinen pesimälintu.
17. **Passer domesticus* (L). Tavalliseen tapaan yleinen ihmisasunnoilla.
18. **Emberiza c. citrinella* L. Yleinen viljelysmailla sekä muillakin niityillä ja valoisissa metsissä. Pesälöytö: 10. VI 24 4 haudottua munaa.
19. **Emberiza hortulana* (L). Verrattain runsaslukuinen viljelysmailla.
20. **Emberiza sch. schœniclus* (L). Hailuodon, tyyppilintuja. Pesii runsaslukuisena kaikilla kosteilla pensaisilla mailla. Pesälöytöjä: 8. VI 24 6 jotensakin tuoretta munaa, 9. VI 24 valmis pesä, 9. VI 24 3 tuoretta munaa, 10. VI 24 6 haudottua munaa, 10. VI 24, 5 haudottua munaa, 14. VI 24 6 jotensakin tuoretta munaa, 13. VI 24 2 poikasta ja 2 munaa, 19. VI 24 valmis pesä.
21. ↑↓ *Calcarius l. lapponicus* (L). Yhtävähän kuin pulmusta, ei lapinsirkkuakaan Sandman'in jälkeen ole tavattu pesivänä Hailuodolla. Muuttoaikaan sensijaan esiintyy se runsaslukuisena.
22. ↑↓ *Plectrophenax n. nivalis* (L) Sandman mainitsee pulmuseen tavatun kerran pesivänä itse Hailuodolla. Suullisen ilmoituksensa mukaan on löydetyn pesän kuuluminen tälle lajille kuitenkin epävarma. Myöhemmin ei pulmusta ole tavattu pesivänä Hailuodolla, ja on sen pesiminen muuallakin Pohjanlahden saaristossa epävarma.
23. **Alauda a. arvensis* L. Yleinen viljelysmailla.
24. **Anthus t. trivialis* (L) Yleinen pesimälintu kaikissa valoisissa metsissä.
25. **Anthus pratensis* (L) Harvalukuinen pesimälintu.

26. **Motacilla f. flava* (L). Harvalukuinen pesimälintu.
27. **Motacilla flava thunbergi* (Billberg). Tavattu edellisen lajin ohella, pesinee hyvin harvalukuisena.
28. **Motacilla a. alba* L. Verrattain runsaslukuinen rannoilla ja viljelysmailla. Pesälöytöjä: 10. VI 24 6 haudottua munaa, 9. VI 24 5 haudottua munaa, 9. VI 24 6 jokseenkin tuoretta munaa, 15. VI 24 pieniä poikasia, 13. VI 24 6 hyvin haudottua munaa.
29. () *Certhia f. familiaris* (L). 3. I 15 tapasin hömötiaisten joukosta mäntymetsässä Santosessa yhden yksilön. On luultavaa, että laji muulloinkin vierailee saarella.
30. **Parus m. major* L. Vuonna 1916, jolloin asustin koko kesän Hailuodolla, tapasin talitiaista pitkin kesää, joten se pesinee Hailuodossa. Sandmain'ille pesiminen tuntematon.
31. ? *Parus a. ater* L. Epävarma havainto 10—11. VII 1911.
32. ? *Parus caeruleus* L. Sandman'in, munien perusteella tehty lajimääräys lienee katsottava epävarmaksi.
33. **Parus atricapillus borealis* Selys. Yleinen. Pesä: 2. VII 1903 8 munaa, 8. VI 1924 hyvin haudottuja munia, 8. VI 24 pieniä poikia.
34. () *Ægithalos c. caudatus* (L). Parvi, 6 kappaletta tavattu 13. XII 1910.
35. **Regulus r. regulus* (L). 17. V ja 19. V 1913 tapasin Hanhisessa ainakin yhden parin. Sandman'ille tuntematon.
36. **Bombycilla g. garrulus* (L). Sitten englantilaisen Dresser'in ja Sandman'in aikojen lienee tilhi useita kertoja, ehkäpä vuosittainkin, pesinyt Hailuodolla päättäen useista keskikesälöydöistä ja tavatusta poikueesta.
37. **Muscicapa s. striata* (Pall.). Harvalukuinen pesimälintu. Pesälöytö: 12. VII 16 1 puolikasvuinen poikanen.
38. **Phylloscopus t. trochilus* (L). Lienee runsaslukuisin Hailuodon linnuista.
39. **Acrocephalus schoenobaenus* (L). Pesii verrattain yleisenä. Hailuoto on ruokokertun parhaita asuinpaikkoja Suomessa. Pesä: 19. VI 24 5 tuoretta munaa.
40. **Locustella fluviatilis* (Wolf). Sandman'in mukaan tavattu pesivänä v. 1889.
41. **Sylvia borin* (Bodd.). Sandman tapasi vain yhden kerran pesivänä. Nykyisin pesii lehtokerttu harvalukuisena kaikkialla Hailuodossa.

42. **Sylvia c. communis* Latham. Kesäkuun lopulla 1924 asusti Hanhisessa ainakin yksi laulava koiras.

43. **Sylvia c. curruca* (L). Harvalukuinen, pesii vuosittain. 11. VI 24 pesä 6 tuoretta munaa.

44. **Turdus pilaris* L. Pesii verrattain yleisenä. Munallisia pesiä: 11. VI 24 4 tuoretta munaa, 11. VI 24 4 haudottua munaa, 13. VI 24 5 haudottua munaa, 20. VI 24 poikasia.

45. **Turdus ph. philomelos* Brehm. Pesii harvalukuisena kaikkialla havumetsissä.

46. **Turdus musicus* L. Runsaslukuinen pesimälintu; 13. VI 24 pesä, 4 tuoretta munaa.

47. **Cenanthe œ. cenanthe* (L). Rannoilla, viljelysmailla y. m. aukeilla mailla verrattain yleinen.

48. **Saxicola r. rubetra* (L). Verrattain yleinen aukeilla pensaikkaa kasvavilla niityillä ja viljelysmailla.

49. **Phoenicurus ph. phoenicurus* (L). Pesii verrattain runsaslukuisena aukeissa metsissä. Pesä: 9. VI. 24 5 tuoretta munaa, 9. 6. 24 7 hyvin haudottua munaa, 18. VI. 24 munia, 19. VI. 24 5 hyvin haudottua munaa.

50. ↑↓ *Luscinia s. svecica* (L). Sandman tavannut, mutta oli pesiminen epävarmaa.

51. **Erithacus r. rubeculus* (L). Sandman mainitsee punarinnan satunnaisesti pesineen Hailuodolla. Nykyisin pesii lintu kuitenkin harvalukuisena vuosittain.

52. **Prunella m. modularis* (L). Sandman'in mukaan tavattu pesivänä v. 1889.

53. ↑↓ *Cinclus c. cinclus* (L). Harvinainen vieras Hailuodolla, ammuttu 7. XI 16.

54. **Hirundo r. rustica* (L). Pesii tavalliseen tapaan ihmisasunnoilla, mutta tavataan myös aukeilla rantaniityillä, pesien saunoihin ja latoihin: Pesälöytöjä: 7—8. VII 1916 puolikasvuisia poikasia, 9. VI 24 useita pesiä, yhdessä yksi muna. 15. VI 24 1 muna, 17. VI 24 1 muna, 20. VI 24 valmis pesä, 20. VI 24 2 tuoretta munaa.

55. **Delichon u. urbica* (L). Yleinen ihmisasunnoilla.

56. **Riparia r. riparia* (L.). Varemmin pesinyt muutampia pareja hiekkatörmään Ojakylässä. Myöhemmin hävinnyt?

57. ↑↓ *Micropus a. apus* (L). Nylander sanoo tätä lajia yleiseksi Hailuodossa ja sen pesivän sangen lukuisesti kirkon tornissa:

Sandman taas ei ole sitä tavannut ollenkaan. — Tavataan harvalukuisena muuttoaikaan. Tuskin pesinee.

58. () *Dryobates m. major* (L). Hyvin harvalukuinen (satunnainen?).

59. () *Dryobates m. minor* (L). Sandman'in jälkeen ei ole tavattu.

60. () *Picoides tridactylos* (L). Ammuttu talvella Hanhisessa (Yliop. Eläintiet. Museo).

61. () *Dryocopus m. martius* (L). Sandman'in mukaan tavattu muutamia kertoja ja Rydman'in mukaan hakannut kirkon seinät reijille. Myöhempiä tietoja palokärjestä ei ole.

62. **Iynx t. torquilla* L. Hyvin harvalukuinen (Sandman sanoo sitä hyvin yleiseksi).

63. **Cuculus c. canorus* L. Harvalukuinen.

64. †↓ *Nyctea nyctea* (L). Monta kertaa tavattu.

65. **Asio flammeus* Pontopp. Hyvin harvalukuinen, todennäköisesti pesii.

66. () *Cryptoglaux f. funerea* (L). Useita kertoja tavattu. Pesiminen tuntematon.

67. ? *Surnia u. ulula* (L.). Sandman'in jälkeen tuntematon.

68. * *Falco p. peregrinus* Tunstall. Pesinee vuosittain Hailuodossa. Pesälöytöjä: 22. VI 1911 isoja untuvapoikasia, 4. VI 1912 3 munaa, 11. VII 1917 isoja poikasia.

69. **Falco s. subbuteo* L. Tavattu useita kertoja, keskikesälläkin.

70. †↓ *Falco columbarius aësalon* Tunstall. Tavataan ainakin muuttoaikaan.

71. **Falco t. tinnunculus* L. Pesinee harvalukuisena. Pesälöytö: 11. VI 24 3 haudottua munaa.

72. () *Aquila ch. chrysaëtus* (L). Useita kertoja tavattu.

73. () *Buteo vulp. intermedius* Menzb. Tavattu. Pesiminen epä tietoinen.

74. †↓ *Buteo l. lagopus* (Brünnich). Tavataan muuttoaikaan.

75. **Circus c. cyaneus* (L.). Säännöllinen pesimälintu Hailuodossa.

76. () *Accipiter gentilis* (L). Tavattu.

77. **Accipiter n. nisus* (L). Tavannut sekä muutto- että pesimisaikaan.

78. () *Haliæetus albicilla* (L). Ilmoitetaan nähdyn.

79. () *Pernis a. apivorus* (L.). Kerran tavattu.
80. * *Pandion h. haliaetus* (L.). Pesii hyvin harvalukuisena (tuskin yhtä paria enempää).
81. ↑↓ *Cygnus cygnus* (L.). Tavataan vuosittain muuttoaikaan, mutta ei enää läpi kesän, kuten Sandman'in aikaan.
82. ↑↓ *Anser erythropus* (L.). Muuttoaikaan kevään syksyn majailee melkoisia parvia Hailuodossa.
83. ↑↓ *Anser f. fabalis* Latham. Muuttoaikaan suuria parvia.
84. * *Anser anser* (L.). Merihanhen pääpesimispaikka Suomessa lienee Hailuoto. Vuosittain pesivien parien lukumäärä on ainakin suuri kaksinumeroinen luku.
85. * *Anas p. platyrhyncha* L. Hailuodon runsaslukuisin sorsalaji.
86. * *Anas c. crecca* L. On harvalukuisempi kun jouhi- ja sinisorsa. Muuttoaikaan suuria parvia.
87. ? *Anas querquedula* L. Nylander'in ilmoitus heinätavista Oulun seutuissa („yleinen“) on nähtävästi erehdys, sillä ei Sandman eikä allekirjoittanutkaan ole sitä Hailuodossa koskaan tavannut.
88. * *Anas penelope* L. Sitten Sandmanin aikojen lienee haapanan lukumäärästä tapahtunut suuri muutos huonompaan päin, sillä nykyisin on haapana Hailuodossa verrattain harvalukuinen pesimälintu (ennen sangen yleinen).
89. * *Anas a. acuta* L. Sandman ilmoittaa jouhisorsan olleen runsaimman sorsalajeista. Pesii vieläkin verrattain runsaslukuisena mutta kuitenkin on sinisorsaa paljon vähälukuisempi.
90. * *Spatula clypeata* (L.). Hailuoto on tietävästi lapasorsan pesimäalueen pohjoinen kärki Suomessa. Useita nähtävästi kymmeniä pareja pesii vuosittain. Pesälöytöjä: 9. VI 24 4 tuoretta munaa, 9. VI. 24 2 tuoretta munaa, 14. VI 24 3 tuoretta munaa, 16. VI 1904 8 munaa.
91. * *Nyroca f. ferina* (L.). Sandman tapasi 13. VII 89 tämän lajin pesän. Nykyisin pesii punanarsku, ehkä kymmenkunta paria, vuosittain. Pesälöytö: 9. VI 24 8 tuoretta munaa.
92. * *Nyroca fuligula* (L.). Hailuodon runsaslukuisin kokosukeltaja, kymmeniä, ehkä satoja pareja pesii vuosittain.
93. ↑↓ *Nyroca m. marila* (L.). Nylander sanoo tätä lajia Hailuodolla „yleiseksi“ ja Sandman „tavattoman yleiseksi“. Nykyisin voitane lapanarskun pesimisen kohdalle Hailuodossa piirtää ristin merkki. Ainakaan en ole kyennyt yhtään pesimistapausta toteamaan

enkä edes pesimisaikaan tätä tosin helposti edelliseen runsaslukuiseen lajiin sekoitettavaa lintua tapaamaan.

94. ↑↓ *Bucephala c. clangula* (L.). Muuttoaikaan ja läpi kesänkin suuria, pesimättömiä parvia. Sopivien sisävesien puute, meriveden „pelko“ ja ehkä sopivien pesäpaikkojenkin puute näyttää estävän tätä lajia Hailuodolla pesimästä.

95. ↑↓ *Clangula hyemalis* (L.). Tätä lajia ei ole koskaan tietävästi tavattu Hailuodossa, mutta kyllä harvalukuisena muuttoaikaan lähimerillä.

96. **Oidemia f. fusca* (L.). Sandman'in aikana „hyvin yleinen“. Vielä v. 1902 pesi tätä lajia melkoinen määrä Hailuodossa, mutta on sittemmin vuosi vuodelta niin vähennyt, että kesällä 1924 asusti Hanhisessa vain noin kymmenen paria.

97. ↑↓ *Oidemia n. nigra* (L.). On omituista, että Sandman ei mainitse tätä lajia lintuselostuksessaan huolimatta siitä, että se Nylanderin mukaan on Hailuodossa lähes yhtä yleinen kuin tukkarnasku. — Ei pesi Hailuodossa, tavataan harvalukuisena muuttoaikaan.

98. ?*Somateria m. mollissima* (L.). Ei tiettävästi koskaan pesinyt itse Hailuodolla, mutta kyllä hyvin harvalukuisena läheisillä ulkokareilla, josta se nyttemmin kuitenkin näyttää olevan sukupuuttoon hävitetty.

99. **Mergus m. merganser* L. Kymmeniä pareja ja ehkä enemmänkin pesii Hailuodossa vuosittain, valiten pesäpaikoikseen latojen ja riihien alustat ja lakat.

100. **Mergus s. serrator* L. Melkein runsaudeltaan edellisen kaltainen on pensaikkoihin pesivä pikkukoskelo.

101. ↑↓ *Mergus albellus* L. 17. V 1913 tapasin Pöllän lahdessa kaksi paria ja Syväkarinlahdessa yhden koiraan.

102. ↑↓ *Phalacrocorax c. carbo* (L.). Nähtävästi vuosittain muuttoaikaan.

103. ?*Podiceps c. cristatus* (L.). Sandman on tavannut Hailuodossa pesyeen, joka mittoineen sopii parhaiten silkkiuikulle. Saman on allekirjoittanutkin tehnyt, mutta kun itse lintua Hailuodolla ei koskaan ole nähty, kuulunevat pesyeet sittekin härkälinnulle.

104. **Podiceps g. griseigena* (Bodd). Muutamia pareja pesii edelleenkin etupäässä Syökarinlahdessa.

105. **Podiceps auritus* (L.). Joitakin kymmeniä pareja pesii Syökarinlahdessa ja Hankasalmissa y. m. järvissä.

106. **Colymbus a. arcticus* L. Muutamia pareja pesii sisälampiin.

107. **Colymbus stellatus* Pontopp. Pesii kuten edellinen laji saaren sisävesiin.

108. **Columba livia domestica* (L). Tiettävästi vain kahdessa talossa.

109. **Charadrius hiaticula* L. Yleinen hiekkarannoilla. Pesälöytöjä: 30. VI 1903 1 muna, 16. VI 1904 4 munaa, 18—22. VI 1910 4 munaa.

110. **Charadrius dubius curonicus* Gm. 7—8. VII 1916 asusti pikkutylli Matikanniemessä. Myöhemmin kerran pesivänä tavattu.

111. ↑↓ *Charadrius a. apricarius* L. Verrattain yleinen muutto-
aikaan. Sandman ei mainitse tätä lajia.

112. ↑↓ *Charadrius morinellus* (L). Epävarma muuttoaikaan.

113. **Vanellus vanellus* (L.). Tavattu useita kertoja ja todennäköisesti pesinytkin.

114. **Arenaria i. interpres* (L) Itse pääsaarella ei karikukko pesine (Sandman kerran pesän tavannut), mutta tavataan muutto-
aikaan harvinaisena ja pesii melkein jokaisella ulkokarilla.

115. ↑↓ *Calidris alpina* (L). Nylander sanoo tätä lajia yleiseksi Hailuodolla, Sandman taas ei sitä kertaakaan tavannut. — Tavataan verrattain yleisenä muuttoaikaan.

116. ↑↓ *Calidris minuta* (Leisl.). Tämä Jäämeren lintu esiintyy Hailuodolla muuttoaikaan säännöllisesti kevään syksyin, päättäen Hailuodon lähistöllä tehdyistä havainnoista. Itse Hailuodossa 16—20 VIII 1916 parvi, jossa oli 20—30 lintua.

117. **Calidris temminckii* (Leisl). Ehkä satoja pareja pesii rannoilla ympäri Hailuodon. Pesälöytöjä: 16. VI 1904 4 munaa, 16. VI 1904 3 tuoretta munaa, 15. VI 1924 3. tuoretta munaa, 20. VI 24 3 jotensakin tuoretta munaa.

118. **Philomachus pugnax* (L). Muuttoaikaan runsaslukuisen, pesii harvalukuisena.

119. ↑↓ *Limicola f. falcinellus* (Pont.). Ei ole Nylanderin jälkeen tavattu itse Hailuodolla, vaikka se kyllä todennäköisesti muuttoaikaan täällä esiintyy, päättäen Iissä, Haukiputailla ja Oulussa tehdyistä huomioista.

120. ↑↓ *Tringa erythropus* (Pall.). On kummallista että Sandman ei mainitse mustaavikloa, vaikka se muodostaakin huomattavan osan niistä melkoisista kahlaajaparvista, jotka muuttoaikaan majaillevat Hailuodolla. Tavataan läpi kesänkin, mutta pesiminen on aivan epävarmaa.

121. **Tringa t. totanus* (L.). Kymmeniä pareja pesii rannoilla. Pesälöytöjä: 30. VI 1903 3 munaa, 10. VI 1904 1 tuore muna, 16. VI 1904 4 munaa, 10. VI 1908 1 tuore muna, 18. VI 1910 4 munaa, 9. VI 1924 1 tuore muna.

122. ↑↓ *Tringa nebularia* (Gunn.). Se, mitä edellä on sanottu mustaviklosta, sopii täsmälleen tähänkin lajiin.

123. **Tringa glareola* L. Muuttoaikaan yleinen; Sandman tavannut pesivänä. Myöhemmin pesiminen tuntematonta, mutta tavattu läpi kesät.

124. () *Tringa hypoleucos* L. Tämä sisävesien lintu on Hailuodolla aivan satunnainen vieras. Sandman tavannut kerran pesivänä.

125. ↑↓ *Phalaropus lobatus* (L.). Tavattu useasti kesäkuusakin (esim. 22. VI 1911 ja 10. VI 08) mutta pesiminen on epätietoinen, se ei kuitenkaan tunnu mahdottomalta, koska vesipääsky pesii vuosittain hiukan pohjoisempana, lin ulkosaaristossa.

126. **Numenius a. arquatus* (L.). Varmaankin satoja pareja isokuoveja pesii meren rannoilla ja sisäniityillä.

127. **Numenius ph. phaeopus* (L.). Muuttoaikaan tavallinen, pesivänä satunnainen.

128. **Capella g. gallinago* (L.). Harvalukuinen pesimälintu.

129. ↑↓ *Lymnocyptes minimus* (Brünn). Sandman tavannut harvalukuisena pesimälintuna, sittemmin pesiminen tuntematon, mutta tavattu kesäkuun alussa.

130. **Hæmatopus o. ostralegus* L. Hailuodon aukeat rannat ovat mieluisia pesäpaikkoja meriharakalle. Pesälöytöjä: 16. VI 1904 1 hyvin haudottu muna, 16. VI 1904 1 tuore muna, 16. VI 1904 3 munaa, 18. V 1906 1 tuore muna, 19. V. 1906 1 tuore muna, 13. VI 1907 2 munaa, 14. VI 1907 2 munaa, 12. VI 1908 3 munaa, 12. VI 1908 1 muna, 18—22. VI 1910 2 jotensakin tuoretta munaa, 9. VI 24 3 tuoretta munaa.

131. **Hydroprogne t. tschegrava* (Lep.). Itse Hailuodolla ei räyskä pesi (Sandman'in aikana satunnaisesti), mutta kyllä hyvin harvalukuisena muutamilla kauempana olevilla kareilla.

132. **Sterna h. hirundo* L. Tiira (*Sterna* species) pesii yleisenä ympäri Hailuodon.

133. **Sterna macrura* Naum. Pesii edellisen lajin yhteydessä, mutta missä määrin, ei ole selvitetty.

134. () *Larus marinus* L. Pari kertaa tavannut, ei pesi.

135. **Larus a. argentatus* Pontopp. Sandmanin aikaan pesi harmaalokki Hanhisjärvessä Hailuodossa. Viime vuosina ei harmaalokki ole enää pesinyt täällä, mutta kyllä eräällä toisella järvellä.

136. **Larus f. fuscus* L. Pesii tuskin itse pääsaarella, mutta kyllä ympäröivillä ulkokareilla.

137. **Larus c. canus* L. Melkoinen määrä pesii sekä meren rannoilla että vähemmässä määrin sisäjärvellä. Yleisin lokeista.

138. () *Larus minutus* Pallas. Sandman'in jälkeen ei pikkulokin pesimisestä Hailuodossa ole varmuutta, vaikkakin se on siellä useasti tavattu.

139. **Larus r. ridibundus* L. Sandman'in jälkeen on naurulokki useita kertoja tavattu Hailuodossa ja pesinytkin (yksi pari v. 1924).

140. **Stercorarius parasiticus* (L). Muutamia pareja pesii Hailuodon rannoilla.

141. **Alca torda* L. Ei pesi Hailuodolla, mutta kyllä muutamilla etempänä olevilla kareilla.

142. **Uria grylle* (L). En ole kuten Sandman tavannut riskilää pesivänä itse Hailuodolla, mutta kyllä ympäröivillä kareilla.

143. **Megalornis g. grus* (L). Useita pareja pesinee vieläkin; läpi kesän ja varsinkin muuttoaikaan suuria parvia.

144. ? *Porzana porzana* (L). Tämä Sandman'in mukaan runsaslukuinen laji on myöhemmin Hailuodosta aivan tuntematon.

145. **Crex crex* (L). Kirkkoherra E. Virkkulan mukaan asunut läpi kesän 1906 pappilan luona.

146. () *Fulica a. atra* L. 8—9. VII 1916 tapasin yhden nokikanan Syökarinlahdella.

147. **Lagopus l. lagopus* (L). Ehkä runsaammin kuin lähimantereella.

148. **Lyrurus t. tetrix* L. Kuten mantereellakin tai runsaammin.

149. **Tetrao u. urogallus* L. Tavataan kuten mantereellakin.

150. () *Perdix perdix robusta* Hom. & Tancré. Sandman'in jälkeenkkin tavattu useita kertoja Hailuodolla. Pesiminen epätietyinen.