

## Bidrag till kännedom av fågelfaunan i Sodankylä Lappmark.

Observationer gjorda under resor därstädes huvudsakligen  
sommaren 1924

Av frih. JARL CARPELAN

Sommaren 1924 blev undertecknad förordnad till forstarbeten i norra Finland. Distriktskontoret i Rovaniemi var så tillmötesgående att jag, tack vare mina naturvetenskapliga intressen, fick välja i vilken trakt jag arbetade. Jag valde Sodankylä socken, som är mindre undersökt i ornitologiskt avseende.

Vad temperaturen och vädret vidkommer, var sommaren mycket omväxlande. Försommaren var kall med snöglopp och långvariga kalla regn ännu omkring medlet av juni. I början av juli blev det dock varmare, och en så gott som fullkomlig avsaknad av nederbörd under ett par månaders tid gjorde att blixten under upprepade häftiga åskväder härunder anstiftade ett otal större och mindre skogseldar. Ej ens på de blötaste mossarna fanns vatten, och dyn var torr och sprucken. Hösten var vacker, tidtals med rikligare nederbörd, och i medlet av oktober föll den första snön.

För att få en ungefärlig bild av mitt operationsfält och mina resor må nämnas, att jag den 9 anlände till Sodankylä och till början av juli stämplade omkring Kelujoki nedre lopp, vid Jeesiönjoki och på Postovaara och Kannusselkä i Petkula. Under juli och nästan hela augusti företog jag främst till följd av skogseldarna, bland annat en färd via Vaalajärvi till Unari och därifrån österut till Torvinen by invid stora landsvägen. En lång resa utgjorde ruten Sodankylä—Vuotso—Enare gräns—Vuotso—Mutenia—Korvanen by—Pihtijoki—Lokka by—Korvanen—Vuotso—Sodankylä, ävensom Sodankylä—Kersilö—Moskuvaara—Luiro—och retur. Hela hösten, från slutet av augusti till medlet av oktober åtgick till en stämplingsfärd till brandskogarna vid Pihtijokis (biflod till Luiro) mellersta lopp och Silmävaara med omgivningar (Kopsusjoki). Under en resa med häst i januari 1926 blev jag även i tillfälle att göra några observationer. I förbigående må nämnas att jag den 19. VI 1924 företog en ornitologisk exkursion i den kända engelska fågelforskaren F. C. R. Jourdain's sällskap.

Under alla dessa resor gjordes en hel del ornitologiska iakttagelser, vilka nedan relateras mot fonden av mag. C. Finniläs „Ornitologiska iakttagelser från Sodankylä Lappmark sommaren 1913“, i vilken publikation jämväl andra forskares observationer äro omnämnda. I denna publikation anföres för övrigt undersökningsområdets topografi, läge, storlek m. m.

Tack vare den omständigheten att Finnilä besökte området redan under fåglarnas flyttningstid och även var i tillfälle att undersöka fjällfaunan, är antalet av honom antecknade fågelarter betydligt större än de av mig observerade, om ock en del för området helt och hållet nya, d. v. s. förut ej omnämnda arter av undertecknad nu anträffades.

Sålunda har, såvitt jag vet, tidigare varken Finnilä eller andra anträffat följande av mig annoterade arter: *Falco r. rusticolus* L., *Lymnocyptes minimus* (Brünn.), *Branta leucopsis* (Bechst.).

Av andra och undertecknad, men ej av Finnilä observerade: *Lanius e. excubitor* L., *Plectrophenax n. nivalis* (L.), *Loxia c. curvirostra* L., *Dryocopus m. martius* (L.), *Bubo b. bubo* (L.), *Lyrurus t. tetrrix* (L.), *Tetrastes b. bonasia*. (L.).

Som komplettering av Sodankylä fågelfauna bör med skäl bifogas *Tringa stagnatilis* (Bechst.), av vilken för landet nya art Finnilä vid Riestonjoki såg tre exx. (ett skjutet), men om vilket fynd han ingenting nämner i sin publikation.

Beträffande fågelfrekvensen bör särskilt anmärkas det faktum, att undertecknad, även på ställen där *sidensvansen* av Finnilä 1913 blev rikligt funnen, observerade arten endast en gång. *Columba livia domestica* (L.) hade helt och hållet försvunnit från Sodankylä kyrkoby. *Emberiza rustica* (Pall.) anträffades däremot ovanligt rikligt år 1924 emot att Finnilä blott såg 1 ex. (1913). Även föreföll bofinken att vara allmännare då än vad Finnilä angiver.

I nedanstående förteckning har Hartert's nomenklatur använts.

*Corvus c. corax* L. Sparsamt förekommande. 15. VII observerades 1 ex. vid Kärsilö by och vid Pihtijoki några enstaka gånger under höstens lopp.

*Corvus c. cornix* L. Liksom föregående.

*Pica pica* (L.). I Sodankylä kyrkobys omgivningar förekom skatan allmänt, varemot den för övrigt var tämligen sällsynt.

*Cractes i. infaustus* (L.). Förekom i de större barrskogarna om ock ej synnerligen talrikt. Anses av befolkningen för lyckofågel.

*Carduelis l. linaria* (L.). Åtminstone ställvis allmän häckfågel. Ännu så sent som 11. VI uppträdde arten i flockar vid nedre Kelujoki.

*Pinicola e. enucleator* (L.). Tallbiten förekom mycket sparsamt i de stora skogarna. Endast några få exemplar observerade jag bl. a. vid Postovaara och i Pihtijoki trakterna, under sommarens och höstens lopp.

*Loxia c. curvirostra* L. Mindre flockar, sannolikt av denna art, anträffades några gånger på Kannusselkä och Postovaara. I Pihtijokis stora tallskogar var den något allmännare. I januari 1926 uppträdde korsnäbben i mängd på undersökningsområdet, vilket mest berodde på den rikliga förekomsten av grankottar. I allmänhet sågs den uppträda parvis, vilket tydde på att fortplantningsinstinkterna vaknat; dessutom voro mindre flockar synliga här och där.

*Fringilla c. caelebs* L. Bofinken förekom sparsamt å undersökningsområdet, men föreföll att vara något allmännare i bebodda trakter. Den 16. VI såg jag på kornåkrarna vid Mikkuurova (Sattasjoki) bland en mängd bergfinkar även ett tiotal av ifrågavarande art. Vid Käyrämö (Luiro) anträffades några exx. den 12. VIII. Vid Pihtijoki åter anträffade jag ej arten.

*Fringilla montifringilla* L. Synnerligen allmän görande stor skada på kornfälten om vårarna i synnerhet 1924 då det ännu i medlet av juni var mycket kyligt. Den 4. X sågs stora flockar vid Korvanen by.

*Passer d. domesticus* (L.). Arten förekom mer eller mindre allmänt i byarna; utom i de byar Finnälä uppger anträffade jag husfinken i några par även i Vaalajärvi by.

*Emberiza c. citrinella* L. Gulsparven förekom allmänt omkring de större byarna och saknades ej heller vid torpen i ödemarken, men var däremot sällsynt annorstädes.

*Emberiza hortulana* L. Hörd av mig endast en gång i närheten av kyrkobyn i medlet av juni.

*Emberiza rustica* Pall. Finnälä annoterade (år 1913) endast ett fynd av arten; jag anträffade den ställvis t. o. m. allmänt förekommande, vilket framgår av nedanstående fynd: den 12 juni fann jag ett bo av arten vilket innehöll 6 små ungar och var beläget vid roten av en björkbuske på för videsparven typisk lokal, d. v. s. ett grankärr invid Soutonivankangas nära Kelujoki. Medan hanen oroligt hoppade från träd till träd upphävande sitt för den invigde

mycket lätt igenkännliga varningsrop tsy-tsy, fladdrade honan långs marken i närheten av boet likt en mycket skadad och till flykt oförmögen fågel. Detta beteende har jag även iakttagit vid andra bon av denna art. Den 27. VI observerade jag en orolig vide-sparvhona vid Paskahaara (invid Postovaara) och följande dag hörde jag ett exemplar vid ett annat ställe av sagda bäck. I trakterna öster om Unari sjö syntes arten vara rätt allmänt förekommande, jag hörde den flerfaldiga gånger 24. VII under en vandring Unarijärvi—Puunuvaara—Torvinen; dessutom såg jag under samma färd ett par, en hane och en ungfågell.

*Emberiza sch. schœniclus* (L.). Arten förekom allmänt vid sankar, med vide bevuxna sjö- och älvstränder, vilka utgöra dess typiska häckningslokal.

*Plectrophenax n. nivalis* (L.). Om ock arten sommartid är sällsynt och uppehåller sig uteslutande på fjällen, torde den vintertid besöka byarna. Under en resa i medlet av januari 1926 anträffade jag på landsvägen söderom Sodankylä några exx. av snösparven.

*Alauda a. arvensis* L. Hördes blott vid kyrkobyn.

*Anthus pratensis* (L.). Synnerligen allmänt förekommande, främst på samma lokaler som föregående.

*Anthus t. trivialis* (L.). Mindre allmän än föregående. Upphöll sig i bland- och lövskog, helst i sjöars och älvars strandtrakter; 13. VI bo med 5 oruvade ägg å Soutonivankangas några tiotal meter från Kelujoki. Fågeln övergav boet först när jag var så inpå detta att det föreföll som om den flugit bort mellan mina ben.

*Motacilla flava thunbergi* Billb. Allmän på mossarna och kärrängarna.

*Motacilla a. alba* L. Allmänt förekommande speciellt i bebodda trakter. Bortflyttar i början av oktober, 4. X ännu några exx. vid Korvanen by.

*Parus atricapillus borealis* Selys. Mindre allmänt förekommande; påträffades dock ett flertal gånger i skilda delar av området (Kelujoki).

*Parus c. cinctus* (Bodd.) Förekom sparsamt i de södra delarna av socknen, 1 ex. 3. VII å Postovaara, varemot lappmesen norrut tilltog i antal och förekom allmänt i trakterna av Luiri—Pihtijoki, uppehållande sig på allehanda vegetationslokaler (hösten 1924).

*Lanius e. excubitor* (L.). Emedan jag ett flertal gånger erinrar mig ha sett varfågeln, men tyvärr ej antecknat fynden kan jag nu blott anföra följande: 13. VI fästes min uppmärksamhet vid häftiga varningsrop från en mängd olika småfåglar i en skogsbacke. Övansendet kom närmare och slutligen passerade mig en lågt utmed marken flygande varfågel med en sork i klorna, ivrigt förföljd av finkar, grå flugsnappare m. fl. småfåglar. Övannämnda passerade nära nedre Kelujoki. Den 15. VIII obs. 1 ex. vid Kersilö.

*Bombycilla garrulus* (L.). Fåfångt försökte jag konstatera sidensvansen i de trakter (Luiro och Pihtijoki), där Finnilä fann den allmänt. Endast en gång hörde jag sidensvansen, näml. den 3. VII vid Postovaara.

*Muscicapa s. striata* (Pall.). Ehuru jag ej lyckades finna något bo av arten observerades dock denna allmänt i barrskogarna bl. a. vid Kelujoki, Kannusselkä, Postovaara.

*Muscicapa h. hypoleuca* (Pall.). Endast å Mellakangas (Jeesiönjoki) var jag den 20. VI i tillfälle att höra arten.

*Phylloscopus trochilus* (L.). En av traktens allmännaste fåglar i löv- och blandskog. Ett bo i björkskog nära kyrkobyen innehöll 19. VI 2 ägg.

*Turdus pilaris* L. Arten var ej så allmän som *T. musicus*, om den ock ställvis på lämpliga häckningslokaler i blandskogarna och lövskogarna förekom rätt rikligt.

*Turdus v. viscivorus* L. Denna art anträffades endast några gånger: i slutet av juni och början av juli några exx. vid resp. Kannusselkä och Postovaara. Ett detta år (1924) använt bo av dubbeltrasten fann jag i en gran i medlet av juli invid Tähtelä observatorium.

*Turdus musicus* L. Allmän över hela området. 27. VI bo m. 5 halv vuxna ungar par meter högt i björk vid Paskahaara (Petkula). 30. VI. bo m. 5 ägg på marken å Kannusselkä och 3. VII 4 ägg ävenledes på marken å Postovaara. I slutet av september samlade sig trastarna i flockar.

*Turdus ph. philomelus* Brehm. Arten befanns vara allmän i barrskogarna, såväl på sankar som på torra marker. 11. VI. anträffades ett bo m. 5 obetydligt ruvade ägg, ca 2 m högt i en gran på ett kärr nära Kelujoki nedre lopp. 28. VI bo m. halv vuxna ungar 3 m högt i en gran på Kannusselkä (Petkula), 29. VI anträffades

flygga ungar och 30. VI bo med fullvuxna ungar ca 3.5 m högt i gran, alla på Kannusselkä.

*Oenanthe æ. ænanthe* (L.). I bebodda trakter och även i barrskogarna där tillgång på lämpliga häckningsplatser fanns, förekom stenskvättan allmänt. Under ett kullfallet träd hade fågeln å Mellakangas (Jeesiönjoki) 20. VI bo m. synbarligen olegade ägg.

*Saxicola r. rubetra* (L.). Buskskvättan förekommer mycket sparsamt och anträffades endast en gång, nämligen ett ex. vid Kersilö by 15. VIII.

*Phœnicurus ph. phœnicurus* (L.). Allmän i barr- och blandskog. 11. VI fann jag bo m. 8 ägg i en ihålig björkstubbe nära Kelujoki (Soutonivänkangas).

*Luscinia s. svecica* (L.). Finnilä uppger arten som en av områdets allmänna fåglar; undertecknads observationer inskränka sig till ett fåtal, vilka dock härstamma från rätt olika delar av socknen. 17. VII iakttog jag en sjungande hane i ett björkkärr nära Vuotso gästgiveri. I början av augusti anträffades en död fullvuxen unge i Korvanen by och den 15. VIII sågs en hona på två skilda ställen invid vägen Moskuvaara—Kersilö. Något senare visade sig några exx. nära Sodankylä telegraf och 25. VIII 2 exx. ej långt därifrån. Vid Luiro och Pihtijoki observerades blåhaken även ett flertal gånger under höstens lopp.

*Hirundo r. rustica* L. Ladusvalan, som är en sällsynt gäst i Sodankylä, har jag antecknat från kyrkoby.

*Delichon u. urbica* (L.). Synnerligen allmän överallt i bebodda trakter och väl omhuldad av befolkningen, 5. VIII fullvuxna, men ej flygga ungar å Suvanto gästgiveri.

*Riparia r. riparia* (L.). Där lämpliga strandbranter förekommo, fattades i vanliga fall backsvalan ej heller. Några par häckade vid Sattasjoki, och en större koloni vid Kitinen ej långt ovanom kyrkoby. Vid Luiro och Pihtijoki häckade kolonier om 20—30 par på ett flertal ställen.

*Micropus a. apus* (L.). Sällsynt, tydligen beroende av bristen på ihåliga träd. Den 10. VI sågs ett ex. vid nedre Kelujoki, 19—20 juni några exx. å Mellakangas och 30. VII några exx. vid Pihtijoki.

*Dryocopus m. martius* (L.). Ett ex. observerades 17. VI å Postovaara.

*Picoides tridactylus* (L.). Arten förekommer tämligen allmänt. Ehuru jag påträffade den ett flertal gånger kan blott följande datum

nämnas: den 29. VI bo med skrikande ungar i torrfura å Kannusselkä.

*Cuculus c. canorus* L. I synnerhet i bebodda trakter och utmed älvstränderna syntes arten förekomma rikligt. Den 16. VI såg jag långs Sattasjoki från Sattanen by uppåt minst ett tiotal av arten.

*Surnia u. ulula* (L.). Den 6. X sköts ett ex. invid Silmävaara torp. Ej långt därifrån fanns ett ex. något senare livlöst hängande med huvudet nedåt i en björktopt.

*Bubo b. bubo* (L.). Ett i Sodankylä skjutet ex., uppstoppat å Tähtelä.

*Strix nebulosa lapponica* Thunb. Den 12. VI iakttog jag ett ex. på dagen i en tall vid nedre Kelujoki, den 5. X såg jag ett skjutet ex. nära Silmävaara (Kopsusjoki) och den 13. X uppehöll sig ett ex. vid vägen Mutenia—Vuotso. Av storleken att döma var detta en hona.

*Asio f. flammeus* (Pontopp.). I förra hälften av juli svävade ett ex. omkring på fälten nära Sodankylä gästgiveri.

*Falco r. rusticolus* L. I Tanhua skogvaktartorp nära Silmävaara såg jag vingar av arten den 6. X. Fågeln var skjuten våren 1924.

*Falco columbarius aesalon* (Tunst.). Arten torde vara relativt sällsynt. Den 2. VII erhöj jag ett mycket ruvat ägg (med grön bottenfärg) taget från en gran i närheten av Postovaara. Huruvida ägget tillhörde denna art eller *F. s. subbuteo* är svårt att avgöra.

*Aquila ch. chrysaëtus* (L.). Sällsynt. Den 20. VI blev under stämpling ett gammalt bo funnet på en mo söderom Kelujoki nedre lopp. Den 4. X såg jag ett ex. vid Korvanen by. Enligt ortbornas utsago blev paret till fågeln skjutet några år tidigare och hade den återstående ej ännu valt sig ny kamrat. Enligt Käyrämö husbonde finnes ett örnbö, i vars närhet även denna vår fåglarna sågos, sedan urminnestider i en stor gran på den långa holmen i Luro—Neitikoski; trots ivrigt sökande fann jag det tyvärr ej, emedan holmen är beväxt med synnerligen tät och delvis grov granskog.

*Buteo l. lagopus* (Brünn). Av allt att döma är fjällvråken sällsynt i undersökningsområdet, den sågs t. ex. vid Pihtijoki i september. Klor av arten förevisades mig vid kyrkoby.

*Accipiter gentilis* (L.). I juni påträffades ett gammalt bo av arten på Kannusselkä. I september sågs ett ex. vid Pihtijoki och 12 VIII en ungpall på holmen i Neitikoski.

*Pandion h. haliaetus* (L.) Eti länge använt bo torde finnas nära Jeesiönjokis nedre lopp; arten sågs därstädes även år 1924. Den 15. VI sågs ett ex. vid vägen Moskuvaara—Kerstilö och i medlet av september ett ex. flygande över Sorvusselkä nära Pihtijoki.

*Anser f. fabalis* (Lath.). Allmän vid de större mossarna. Den 11. VI fann jag ett bo med två ägg, 3 nyss kläckta ungar jämte äggskal vid en tallrot på en av strängarna på Eljaksenaapa. I stället för att äggen kluvits på mitten, som t. ex. hos skogsfågel, hade ungarna här krupit ut genom ändan av ägget liksom fjäriln ur en puppa. På samma mosse anträffades utom detta par 2—3 andra exx. av arten. Den 16. VI sågs ett par vid Sattasjoki. Denna sommar hade två ungar tagits och uppfötts i Silmävaara torp och en i Korvanen by (tagna vid Kopsusjoki och Luiro); fåglarna voro synnerligen tama. Den 30. VII fann jag en rätt stor, död unge på en tuva ca 3 mil uppför Pihtijoki.

*Branta leucopsis* (Bechst.). Av denna sällsynta art fann jag ett våren 1923 i Sompiojärvi skjutet exemplar uppstoppat i en gård i Mutenia by.

*Anas a. acuta* L. Tämlichen allmän. Den 11. VI fann jag vid roten av en buske på en sträng på Eljaksenaapa ett bo med 9 starkt ruvade ägg. I Pihtijoki sågos par ungpullar.

*Anas c. crecca* L. Arten är synnerligen allmän vid älvstränderna och på de stora mossarna. Den 10. VI blev ett bo med 7 ägg funnet invid Kelujoki strand, den 11. VI bo med 7 ägg å mosse nära Soutonivankangas och samma dag ett annat bo med 10 obetydligt ruvade ägg å Eljaksenaapa. Den 29. VII—3. VIII sågos flera halvvuxna ungpullar vid Luiro och Pihtijoki ävensom 3. VIII flygga ungar nära Korvanen by.

*Anas penelope* L. Allmän vid sjöar och älvar. Den 12. VI fann jag ett bo med 7 oruvade ägg under en gran ca 100 m från Kelujoki å Soutonivankangas.

*Nyroca fuligula* (L.). Arten anträffade jag endast en gång, vid Pihtijoki eller Luiro.

*Bucephala c. clangula* (L.). Allmän. Den 29. VII anträffades en hona med små ungar tillsammans med ungar av *M. albellus*.

*Mergus m. merganser* L. Höstetid är arten synnerligen allmän och samlas i stora flockar bl. a. i Sompiojärvi för att fiska. Den 4. X observerade jag i Pihtijoki en flock om ca 20 exemplar. Häckar sparsamt vid älvarna.



*Mergus s. serrator* L. Allmänt förekommande.

*Mergus albellus* L. Salskraken är synnerligen sällsynt i undersökningsområdet. Den 29. VII såg jag i Luiro mellan Korvanen och Pikku Ponku en hona av arten med ungar. Dessa uppehöll sig tillsammans med ungar av *B. clangula*, den flyende flocken anfördes av de olika arter tillhörande mödrarna. Av detta drager jag den slutsatsen, att dessa ruvat i gemensamt bo, vilket även kunnat konstateras av Montell. Arten är för övrigt känd av befolkningen vid Luiro.

*Colymbus a. arcticus* L. Denna art konstaterade jag mycket sällan, den torde vara allmännare i fjälltrakterna.

*Colymbus stellatus* Pontopp. Liksom föregående.

*Tringa erythropus* (Pall.). Arten är synnerligen allmän, speciellt vid Kelujoki. Den 11. VI blevo två bon med 4 ägg (betydligt ruvade) funna på Soutonivankangas. Den 19. VI fann forstm. Sipi 4 ägg i samma trakter, dock söder om Kelujoki. I september fann jag ett bo med sönderslagna ägg på Sorvusselkä (Luiro). Samtliga dessa bon funnos på lavmo 100—300 m från sankmark eller vatten. Uppskrämd från boet lät fågeln höra sitt „tjiuuvitt“ och försvann.

*Tringa nebularia* (Gunn). Allmän. Den 11. VI lyckades jag på en renlavsmo å Soutonivankangas långt från sank mark finna ett bo med 4 obetydligt ruvade ägg. Den 18. VI hade gluttonsnäppan redan små ungar på mo invid Kelujoki, och den 20. VI fanns ett bo med två ägg och två nyss kläckta ungar på Mallakangas (Jeesiönjoki).

*Tringa glareola* L. Denna är områdets vanligaste vadare. Den 13. VI fann jag ett bo av arten med starkt ruvade ägg i en grästuva på en mosse nära Soutonivankangas. Fågeln flög upp när jag kommit ca 10 m ifrån boet.

*Tringa hypoleucos* L. Allmän vid älvarna.

*Philomachus pugnax* (L.). Vid Pihtijoki observerade jag ett ex. den 30. VII.

*Numenius ph. phaeopus* (L.). Vid de större mossarna och myrarna är småspoven relativt allmän. Den 19. VI konstaterades flere par på första stora mosse invid landsvägen Sodankylä—Vaalajärvi. I slutet av juni hördes arten vid Kannusselkä några gånger.

*Lymnocyptes minimus* (Brünn). Den 10. VI fann jag ett nyligen dött ex. av arten på en stubbe nära Soutonivankangas. Huru

den döda fågeln hamnat på stubben, kunde jag ej utröna. Under höstens lopp såg jag vid Pihtijoki två till tre skilda gånger beckasinér, vilka syntes mig tillhöra denna art. Sundman uppgiver ägg av *Capella g. galinago* tagna vid Kelujärvi 18. VII 1882. Att döma av det sena datum tillhöra äggen sannolikt *Lymnocryptes*.

*Megalornis g. grus* (L.). Sparsamt förekommande. Den 12. VI ett par på Lehmärimpiaapa (Kelujoki). Den 24. VII observerades arten mellan Mukkala och Torvinen by i medlet av juli 1926 ett par på en mosse norrom Sattanen by invid landsvägen.

*Sterna macrura* Naum. Finnilä uppgiver arten såsom flerstädes t. o. m. allmänt förekommande; jag lyckades ej en enda gång få syn på den, varav jag är böjd att tro att arten är relativt sällsynt.

*Lagopus l. lagopus* (L.). Allmän, ehuru ej rikligt förekommande. Till följd av den ofördelaktiga våren frös en stor del skogsfågelägg; dock tycktes ripornas ägg varit mindre utsatta för detta än tjäderns. Blott en kull (delvis sönderslagna — frusna?) ägg påträffades, förutom ett bo med 11 friska ägg på myr nära Kelujoki den 19. VI. Ungkullarna uppvisade i regeln 5—8 ungar.

*Lyrurus t. tetrix* (L.). Sällsynt. Den 11. VI bo med 9 ägg å Soutonivankangas (Kelujoki). 30. VI sågs en hona med små ungar på Kannuselkä.

*Tetrao u. urogallus* L. Hösten 1924 fanns det rätt gott om tjädrar, men minimalt med ungfågel. I vissa trakter hade tjäderkullar bevisligen blivit de stora skogseldarnas rov. Den 11. VI fann jag under stämpling vid nedre Kelujoki 5 bon med 5—6 ägg. Den 16. VI fanns två bon med 6 ägg på Postovaara, den 20. VI tre bon med resp. 7, 7 och 3 ägg och 25. VI små ungar å Kannuselkä.

*Tetrastes b. bonasia* (L.). Iakttogs av mig endast en gång, nämligen i granskog ett ex, den 11. VI på Soutonivankangas.

Finnilä uppgiver från Sodankylä 115 arter och 1 underart. Om man medräknar *Vanellus vanellus* (L.), och *Larus a. argentatus* (Pontopp.) vilka lätt igenkännliga fåglar enligt beskrivning påstodos ha skjutits i resp. Mutenia och Lokka byar (den senare 1924) uppginge antalet av i Sodankylä anträffade fåglar till 122 arter. Av dessa torde 105 arter kunna räknas som häckfåglar, 7 som tillfälligt förekommande men måhända häckande. Tre arter äro genomflyttande och 6 tillfälliga irrgäster.