


Kukkosensaaren linnusto kesäkuussa vuosina 1931—1932.








PAUL KARÉN.

Metsälinnut (<i>Waldvögel</i>).	1931	1932
<i>Corvus corone cornix</i> (L.)	3 paria	1 p.
<i>Pica pica fennorum</i> Lönnb.	2 "	1 "
<i>Carduelis l. linaria</i> (L.)	—	3 "
<i>Fringilla c. coelebs</i> L.	24 laul. ♂	23 ♂
<i>Emberiza c. citrinella</i> L.	4 paria	5 p.
<i>Anthus t. trivialis</i> (L.)	1 "	5 "
<i>Motacilla a. alba</i> L.	4 "	1 "
<i>Parus m. major</i> L.	2 "	—
<i>Parus atricapillus borealis</i> Selys.	2 "	2 p.
<i>Regulus r. regulus</i> (L.)	1 "	2 "
<i>Muscicapa s. striata</i> (Pall.)	2 "	4 "
— <i>h. hypoleuca</i> (Pall.)	1 ♂	1 ♂
<i>Phylloscopus trochilus acredula</i> (L.)	20 paria	19 p.
<i>Sylvia borin</i> (Bodd)	2 ♂	3 ♂
— <i>c. communis</i> Lath.	3 "	2 "
— <i>c. curruca</i> (L.)	2 "	3 "
<i>Turdus pilaris</i> L.	6 paria	11 p.
— <i>philomelos</i> Brehm	1 ♂	1 ♂
— <i>musicus</i> L.	15 "	9 "
<i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> (L.)	1 "	2 "
<i>Iynx t. torquilla</i> L.	—	1 p.
<i>Columba p. palumbus</i> L.	1 pari	1 "
(<i>Tringa hypoleucos</i> L.)	1 "	—
<i>Lyrurus t. tetrix</i> L.)	1 "	1 p.
Σ	99	101

Viljelys- ja niittymaiden linnut (<i>Vögel der Acker und Wiesen</i>).	1931	1932
<i>Alauda a. arvensis</i> L.	3 paria	2 p.
<i>Anthus pratensis</i> (L.)	2 "	3 "
<i>Motacilla f. flava</i> L.	12 "	13 "
<i>Oenanthe oe. oenanthe</i> (L.)	1 "	3 "
<i>Hirundo r. rustica</i> L.	6 "	8 "
Σ	24	29

Saaren pinta-ala on 62 ha, josta metsää 38 ha, viljelysmaita 19 ha sekä tonttimaata ja varastopaikkoja 5 ha.



-  Kuusikkoa (*Fichtenwald*).
-  Männikköä (*Kiefernwald*).
-  Lepikköä (*Grauerlenwald*).
-  Kallio- ja kivip. kangasta (*Fels- u. Steinboden*).
-  Peltoa (*Acker*).
-  Niittyä (*Wiese*).
-  Tonttimaata ja varastopaikkoja (*Bauflächen*).

1931. Urpiaisia ja vihreä-varpusia oli myöskin. Kuulin niiden ääniä usein, mutta en voinut päätellä äänistä niiden lukumäärää. Törmäpääskyjä lenteli pari kertaa saaren rannoilla. Ensimmäisellä kerralla oli noin 60 yksilöä käsittävä parvi, toisella 20:tä. Saarelta ei löytynyt yhtään törmäpääskyn pesää, eikä siellä ollut pesimiseen sopivia törmäkiä. Kottaraisia näin pari kertaa, mutta ne olivat kaupungissa pesiviä ja kävivät saarella vain tilapäisesti. Kerran näin myöskin 3 sinisorsaa. — Pesä löysin vain muutamia: Räkättirastaiden pesiä 3 kpl., peipon pesiä 2, yhden kirjosiepon pesän, 5 punasiipirastaan pesää, 2 variksen, 2 harakan, 1 sepelkyyhkyn, 1 metsätiaisen ja yhden keltavästäräkin pesän.

1932. Keltavästäräkeistä asusti 8 paria pelloilla ja 5 paria metsässä olevalla, pientä lepikköä kasvavalla aukeamalla. Räkättirastaat asustivat aivan samalla paikalla kuin viime kesänä. Asumaa-alue on jokseenkin pieni, ja se on metsänlaidassa. Haarapääskyt pesivät saarella olevien kahden talon ulkorakennuksissa.

Pesiä löysin 7 räkättirastaan, 4 punasiipirastaan, 3 peipon, 2 pajulinnun ja 2 keltavästäräkin pesää. Lisäksi 1 keltasirkun, 1 kirjosiepon, 1 kivitaskun, 1 variksen ja 1 sepelkyyhkyn pesän.

Sepelkyyhkyn pesä oli noin 20 metrin päässä viime kesäisestä pesäpuusta. Kirjosiepolla oli pesä samassa onkalossa kuin viimekin vuonna.

Kesäkuun alkupäivinä vieraili saarella 18 yksilöä käsittävä parvi kapustarintoja. Linnut oleskelivat saarella 4 päivää ja viettivät tämän ajan juuri kynnyksellä pellolla ruokaa etsien. Samoin oleskeli saarella pari päivää 4 valkovikloa ja 2 isokuovia.

Zusammenfassung: ¹⁾ Der Vogelbestand der Insel Kukkosensaari im Juni 1931—1932. Die Insel liegt 1 km S von der Stadt Joensuu in Ostfinnland. Das Areal beträgt 62 ha, wovon Wald 38 ha, Acker und Wiese 19 ha sowie Siedlungsgelände 5 ha. Die Verteilung der Wälder auf verschiedene Baumarten geht aus der Karte hervor. Die Wälder sind von mittlerer — guter Bonität, nur kleinere Teile sind felsig oder steinig. — Die Tabelle gibt die Zahl der Paare oder der singenden ♂♂ in den beiden Jahren an. Die Vogeldichte des bewaldeten Teiles der Insel betrug in den Untersuchungssommern 260 resp. 270 Paare/km².

Några fågelbeståndsuppteckningar från Kittilä, Lappland.

ILMARI HUSTICH.

Nedanstående anspråklösa undersökningar äro utförda i juni 1932 i Kittilä socken.

1. *Kvantitativa uppteckningar* 4—10. VI. i Helppi (c:a 100 km norr om Rovaniemi vid Ounasjoki).

Provyta	I	II	III
<i>Turdus musicus</i>	1 par	1 par	—
" <i>philomelos</i>	—	2 par	1
<i>Phœnicurus phœnicurus</i>	2 par	(1)	—
<i>Phylloscopus trochilus</i>	(1)	3 par	1
" <i>collybita</i>	—	—	1
<i>Parus cinctus</i>	—	(12 ²⁾)	1
<i>Anthus trivialis</i>	—	2 par	—
<i>Fringilla coelebs</i>	(1)	1 par	2
" <i>montifringilla</i>	1 par	3 par	2
<i>Carduelis linaria</i>	5 par	2 par	2
<i>Perisoreus infaustus</i>	7 ex.	—	—
<i>Corvus cornix</i>	1 par	(1)	—
<i>Dryocopus martius</i>	1 par	—	—
<i>Cuculus canorus</i>	—	1	—

¹⁾ von der Redaktion.

²⁾ en flock.

Å områdena I och II utfördes dagligen analyser under ovannämnda tidpunkt. De dagliga variationerna voro minimala, varför angivandet av ett medeltal kan försvaras.

Observationstiden icke den lämpligaste, enär några arter ännu ströko omkring Siffrorna inom parentes ange tillfälligt förirrade till undersökningsområdet.