

kasta (iältään 1—2 vrk.; kuoriutuminen tapahtunut 18—19.5.). Emolinnulla oli rengas, josta voitiin todeta linnun olleen peräisin edellä mainitusta Kurun pesästä. Kyseinen pesivä naaraslintu oli siis sukukypsä alle 1-vuotiaana.

Tapausta lähemmin tarkastellen voidaan Ylöjärven pesinnästä laskea (arvioida) kyseisen yksivuotiaan naaraan munimisen alku. Laskussa haudonta-ajaksi on otettu 28 vrk., munintaväliksi 3 vrk. Poikasten yleensä melko vähäisten ikäerojen vuoksi (esim. ko. Ylöjärven pesintä; eräässä 4 poikasen pesyessä nuorimman ja vanhimman poikasen ikäero 4—5 vrk.; eräässä toisessa 2 poikasen pesyessä ikäero n. 2 vrk.) täysitehoisen haudonnan on oletettu alkaneen vasta 2. munan jälkeen. Tällä parilla muninta oli siten alkanut noin 17—18.4. Eräiden jo useampina vuosina samoilla seuduilla pesineiden parien (6 pesää) muninnan keskimääräinen alku vuonna 1968 tapahtui noin 4.4. Näin ollen ensimmäistä kertaa pesineen parin (naaraan) muninta alkoi 2 viikkoa myöhemmin kuin vanhojen parien.

Puheena oleva nuori naarasviirupöllö lienee solminut parisiteet puolisoonsa alle yhdentoista kuukauden ikäisenä.

2) Toinen tapaus, jossa naaraan pesiminen yksivuotiaana on todennäköistä, koskee kesällä 1967 Sahalahdella tavattua viirupöllöä. Kesäkuun 15. päivänä yllätettiin Iso-Saksijärven

maastossa viirupöllö, joka hätäisestä käyttäytymisestä päätellen vaikutti poikasistaan huolehtivalta naaraslinnulta. Etsinnöistä huolimatta poikasia ei kuitenkaan löytynyt (lentopoikue?). Paikalle vietiin pönttö, johon keväällä 1968 oli asetunut viirupöllöpari. Toukokuun 23. päivänä, jolloin pesässä oli kaksi poikasta, naaras vangittiin ja kontrolloitiin. Naaras todettiin merkityksi pesäpoikasena 19.5.1966 Kangasalla (H. Kanerva, R. Latja, J. Savolainen).

Tämä jälkimmäinen tapaus tarvinnee tuekseen muutaman lisähuomautuksen. Ensinnäkin viirupöllö on ensimmäisestä pesimisestään lähtien tunnetusti erittäin voimakkaasti pesäpaikauksellinen laji. Toiseksi sen kuolleisuus on pieni, ja parisiteet puolisoitten välillä ovat vahvat, joten puolisoitten vaihtuminen vuosien mittaan on luultavasti melko harvinaista. Lisäksi etenkin naaraan käyttäytymisestä on helppoa päätellä, onko sillä poikasia huollettavanaan. Nämä edellä mainitut seikat yhdistäen voidaan tämän Sahalahden viirupöllönaaraan pesimistä 1-vuotiaana pitää todennäköisenä.

**Summary:** Age of sexual maturity on Ural Owl.

An Ural Owl ringed as a nestling found laying eggs when eleven months old.

## Faunistisia uutisia

Toim. RAUNO TENOVUO

Toimitukselle tulleiden havaintojen pohjalla on voitu laatia alla olevat katsaukset harvinaisista *Phylloscopus*-löydöistä, sisämaan merilintuhavainnoista ja lintuharvinaisuuksista eri puolilta maata. Näitä luetteloita tullaan seuraavissa numeroissa täydentämään, mikäli havaintoja saadaan lisää. Uusina, toimituksen suunnittelemina aiheina, jotka jo lähinumeroissa saattavat tulla esille, voidaan mainita talvikauden 1968—69 talvehtijat, eteläisten lajien pohjoisrajaha-

vainnot, uusimmat *Locustella*- ja *Acrocephalus*-sukujen harvinaisuuksia koskevat tiedot sekä yhteenvedot eräistä mielenkiintoisista harvinaisuuksista, joista toimitukselle jo nyt on kerääntynyt materiaalia (tällaisia ovat esim. *Anthus cervinus*, *Crex crex*, *Falco peregrinus* ja *Streptopelia decaocto*). Toimitus toivoo maamme ornitologisten lähettävän runsaasti havaintojaan mainituista ja muista vastaavista aihepiireistä.

### Harvinaisten *Phylloscopus*-lajien esiintymisestä Suomessa v. 1968

Katsaus perustuu kaikilta lintuasemilta saatuihin tietoihin; niitä täydentävät muutamat muualla rannikolla tai sisämaassa tehdyt havainnot.

*Phylloscopus inornatus* tavattiin syysmuuton aikana viidellä maamme lintuasemista. Ensimmäiset, 3—5 yks., nähtiin Signilskärillä 23.9.; yksi lintu näkyi vielä seur. päivänä ja viimeinen löytyi 3.10. lajityypillisen äänen perusteella (Yrjö Haila). Myös Lågskärin ensimmäinen havainto ajoittuu syyskuun lopulle (29.9. 1 yks., joka rengastettiin), minkä lisäksi saatiin nähdä rengastamattomat yksilöt 3. ja 4.10. (Eero Haapanen, Olavi Hildén ja Seppo Vuolanto). Isokarissa laji tavattiin ja rengastettiin 26.9. (Jouko Hakala ja Jaakko Kanerva), mikä on toinen havainto saarelta, sillä julkaisematon, ensimmäinen havainto on tehty 28.8.1967 (Jorma Tenovuo). Siikajoen Tavovossa havaittiin 1 yks. jo 13.9. (Heikki Haveri), ja hieman aikaisemmin, 10.9., Suomenlahden rannikolla: 1 yks. saatiin verkosta Espoon Finnänlahdella (Hannu Miettinen ja Reijo Purasmaa). Syksyn yllätyksellisen havainto tehtiin Kajaanin Puistolassa, missä lintu löytyi pihapihlajasta 30.9. (Antti Leinonen).

*P. proregulus* näyttäytyi syksyllä 1968 runsaimmin Lågskärillä, missä havainnot — ainakin 4, mutta luult. 6 yks. — ovat ajalta 29.9.—11.10.; 2 yks. nähtiin samana päivänä 2. ja 9.10. (E. H., O. H. ja S. V.). Laji tavattiin lisäksi Signilskärillä 3.10. (yksilö rengastettiin) ja 4.10. (rengastamaton yks., Y. H.) sekä Säpissä 7.10. (Pertti Kalinainen). Lokakuun alkupuoliviltä on myös ainoa lintuasemien ulkopuolinen löytö: 3.10. saatiin lintu rengastetuksi Helsingin Hietaniemessä (Krister Castrén).

*P. fuscatu*s tavattiin maallemme uutena lajina Säpissä 24.10. (Pertti Kalinainen ja Antti Lastu). Löytö selostetaan myöhemmin yksityiskohdaisemmin. — Mainittakoon, että ruskouuni-lintu tavattiin lokakuussa myös Ruotsissa maal-le uutena lajina (Sveriges Natur 1/69, s. 38), ja Brittein saarilla linnusta tehtiin poikkeuksellisen monta havaintoa samana syksynä (Brit. Birds 61, s. 578). Myös hippiaisuunilinnun

poikkeuksellinen runsaus Brittein saarilla herätti huomiota, kun sen sijaan kirjosiipiunilintu oli pikemminkin vähälukuinen päinvastoin kuin Suomessa (Brit. Birds 61, ss. 577—578).

*P. trochiloides*. Tätä lajia koskevista havainnoista ilmeisesti vain vähäinen osa on toimituksen tiedossa. Ilmoitetuista löydöistä vain yksi on toukokuun puolelta (30.5. laulava ♂ Lappeenrannan Haapajärvellä, Seppo Löfgren), muut pääasiassa kesäkuulta. Outoon aikaan, 18.7. ilmestyi laulava ♂ Kristiinaan viivähtäen paikalla vain muutaman minuutin (Per-Åke Johansson ym.). — Lajin levinneisyyskuvaa täydentävät muutamat ennen vuotta 1968 tehdyt havainnot. Näistä merkittävimmät ovat Sotkamon löydöt, kaikki vuodelta 1963. Täällä tavattiin yht. 4 ♂♂ 23.6. alkaen; niistä yksi jäi havaintopaikalle heinäkuun puolelle ja kuultiin viimeksi 24.7. (Eero ja Kimmo Kaakinen).

### Merilintuhavainnoja sisämaasta

Toimituksen arkistoon kertyneessä materiaalissa kiintyy erityisesti huomio siihen, että monista merilintulajeista on lukuisia sisämaanhavainnoja. Toimitus pyrkii jo tässä vaiheessa luomaan näistä yleiskuvan käytettävissä olevan aineiston pohjalta; tätä on tarkoitus myöhemmin täydentää. Näin on mahdollisuus saada tyydyttävä käsitys siitä, mitkä merilinnut muuttavat säännöllisesti maamme yli ja mitkä harhautuvat vain tilapäisesti sisämaahan, sekä millainen on muuton ja harhautumislentojen ajoittuminen.

*Phalacrocorax carbo*. — Maamme eteläosien varsin vähälukuisiin kevätmuuttohavaintoihin liittyvät seuraavat: 24.4.1964 1 yks. Laukaan Torrrossalmessa ja 3.5.1964 1 yks. Konneveden Mieronvirralla (Hannu Kivivuori ym.) sekä 1 yks. Hartolassa 8.5.1966 (E. Hammaren ym.). Lisäksi on Lounais-Suomen rannikolla havaittu sisämaahan päin lentäviä merimetsoja, esim. Mynälähdellä 1.5.1968 1 yks. NE (Harri Päiväranta ym.). — Nokianvirralla maaliskuun jälkipuoliskon 1968 viivähtänyt yks. saattaa olla varhainen muuttaja (Martti Rikonen ym.).

Syysmuuttohavainnot tunnetaan huomattavasti runsaammin, ja esim. Päijänteellä lajin ilmoitetaan olevan jokasyksyinen muuttaja (Martti Purma ja Matti Seppä). Muualta olevat havainnot (7) ovat 12.9.—29.10. väliseltä ajalta.

*Aythya marila*. — 12.5.1968 Kokemäenjoessa Huittisissa 3 koirasta ja 2 naarasta (Heikki Jaakola).

*Melanitta fusca*. — Muutto eteläisen Suomen kautta on säännöllistä sekä keväällä että syksyllä, mutta viipyminen alkutalveen saakka on poikkeuksellista. Heinolan Jyrängönvirrassa oleskeli naaras 5—29.12.1965 sekä 15.12.1967 (Reijo Erola ym.).

*Somateria mollissima*. — Tämän ulkomerilinnun harhautuminen sisämaahan on hyvin harvinaista, ja 1900-luvulta tunnetaan vain yksi havainto (Pohjolan linnut värikuvin). Tämän lisäksi tavattiin 15.4.1968 Tampereella Ratinan savunnona koiras ja 2 naarasta (Lasse ja Markku Kosonen).

*Haliaeetus albicilla*. — Lajin pyyntilennot ulottuvat toisinaan muutamia kymmeniä kilometrejä sisämaahan rannikolta käsin. Tällaisina voidaan pitää ilmoitettuja havainnot Kauvatsan Puurijärveltä 5.5.1968 (Jorma Laurila ym.) sekä Tunturi-Lapista: 16.6.1968 1 juv. Utsjoen Kevolla (Hannu Laine ja Ilkka Oksala) sekä Karigasniemellä ad. 9.6. ja 9.7.1968 (Olavi Hildén ym.). Toisaalta Itä-Suomen havainnot liittynevät Itä-Karjalan pesivään kantaan, esim. 4.5.1968 Höytiäisten kanavan suulla tavattu juv. lintu (Matti Kapanen ym.). Vaikeammin tulkittavissa on talvihavainto Heinolasta, 3.1.1969 (Eero Hietanen) sekä tiedot Tampereen Pyhäjärvellä 23.4.1967 ja 28.9.1968 nähdystä linnusta (Hannu Karhe ym.).

*Haematopus ostralegus*. — Kevätmuuttoa koskevat muutamat tiedot ovat toukokuun puolivälin tienoilta; suurin parvi, 8 yks., on ilmoitettu Sysmästä 15.5.1966 (Eero Hietanen ja Reino Niemi). Poikkeuksellisen aikainen havainto on Nokian Putaanvirralta, missä 27.4.1967 tavattiin 2 yks. (Jorma Laurila ja Risto Palomäki). — Syysmuutosta on ilmoitettu vain pari havaintoa: Itisissä 15.8.1966 1 yks. (Heikki Roiha) ja Hämeenkyrössä 7 linnun parvi 6.8.1967 (Jorma Laurila).

*Arenaria interpres*. — Ilmoitetut kevätmuut-

tohavainnot ovat 17.5.—26.5. väliseltä ajalta; tiedot koskevat yksinäisiä lintuja, poikkeuksena ovat 17.5.1967 Höytiäisten kanavan suistossa tavatut 8 ja 2 yks. (Urpo Häyrinen ja Pekka Salminen). Uutta kevätmuuttohavaintojen aluevaltausta merkitsee Utsjoen Kevolla 11.6.1968 tavattu 6 yks. parvi (Ilkka Oksala). — Sangen niukkoihin syysmuuttoa koskeviin tietoihin liittyy varhainen löytö Vimpelistä, missä 19.7.1964 havaittiin 1 yks. suosirriparvessa (Erkki Takala) sekä Kaukaan Myrkkylahdella 3—9.9.1966 tavatut 2—3 yks. (Jukka Blomqvist ja Esa Sojamo).

*Tringa totanus*. — Melko runsaat kevätmuuttoa koskevat tiedot keskittyvät toukokuun loppupuolelle. Näistä poikkeavat varhainen havainto Lappeenrannan Vainikkalasta (2.5.1968, Seppo Löfgren) sekä myöhäinen, mahd. jo poismuuttavaa yksilöä koskeva tieto Kauvatsan Puurijärveltä 20.6.1967 (Jorma Laurila ja Risto Palomäki). — Eteläisen Suomen aniharvoihin syysmuuttotietoihin on liitettävä Kaukaan Myrkkylahdella 17.8.1967 (2 yks.) ja 20—29.9.1966 (1 yks.) nähdyt linnut (J. B. ja E. S.).

*Stercorarius parasiticus*. — Vähälukuisia sisämaahanhavainnot täydentävät muutamat kevätmuuttoa koskevat tiedot: 2 yks. NNE Parikkalassa 26.5.1968 sekä 1 NE Utsjoen Mantojärvellä 2.6.1968 (Hannu Laine ym.). Lisäksi nähtiin Mynämäenlahdella sisämaahan päin lentävä yks. 11.5.1968 (Juha Varrela ym.).

*S.pomarinus*. — Sisämaan kevätmuuttohavainnot on ilmoitettu Vääkysystä 21.5.1964 (Martti Purma) ja Nurmeksesta 3.6.1964 (Risto Väisänen). 2.6.1968 sekä Utsjoella (1+9 yks. NE, Hannu Laine ym.) että Karigasniemellä (2 N, Olavi Hildén ym.) tehdyt havainnot viittaavat siihen, että Tunturi-Lapin yli koilliseen tapahtuu lajin säännöllistä kevätmuuttoa (vrt. Pohjolan linnut värikuvin).

*Larus marinus*. — Inarin Lapin pesimätietoihin liittyy uusi löytöpaikka: Karigasniemen tien varrella Kesäkotajärvien luona pesivä pari kesällä 1968 (Matti Seppälä).

*Larus hyperboreus*. — 16.6.1968 kierteli 1 juv. (N) Utsjoen Kevojärvellä (Hannu Laine ja Ilkka Oksala).

*Larus glaucoides*. — Tämä vaikeasti määri-

rettävä lokkilaji tavattiin 9.6.1964 Heinolan Maitiaislahdella, missä sitä saatiin tarkkailla hyvissä olosuhteissa. Sama yksilö nähtiin tietävästi vielä heinäkuun alussa (Eero Hietanen).

*Hydroprogne caspia*. — Pesinäkauteen ajoituvia sisämaan havaintoja on niukalti: 1 yks. Parikkalan Siikalahdella 9.6.1959 ja Taipalsaaressa 19.6.1968 (Terho Poutanen). Loppukesän havaintoja on runsaammin ja näistä on pari Lapista: Rovaniemellä 10.8.1966 2 yks. S (Aimo Komonen) ja Utsjoella 4.8.1968 1 S (Ilkka Oksala). Maininnan ansaitsevat myös Pohjanmaan sisäosissa tavatut linnut: Ylivieskan Savelassa 27.8.1965 2 yks. (Erkki Lämsä) ja Rantsilan Kurranjärvellä saalisteleva yks. 16—17.8.1966 (Heimo Mikkola). Myöhäisin sisämaan havainto on Heinolan Maitiaislahdella 12.9.1967 (A. Laitinen).

*Sterna paradisaea*. — Perin vähäisiä eteläisen Suomen läpimuuttohavaintoja täydentävät tiedot Heinolasta, missä 14.5.1965 nähtiin 2 yks. (Eero Hietanen) ja 30.5.1965 1 yks. (J. Kokko). Sisämaan järville ulottuviin saalistuslentoihin viittaa Kalannin Häähjärvellä 9 km rannikolta 16.5.1965 tavattu saalisteleva yks. (Rauno Tenovuuo).

*Sterna albifrons*. — Tästä lähes yksinomaan rannikolla tavattavasta lajista on uusi (kolmas) sisämaanlöytö: 1 yks. Tampereen Iidesjärvellä 16.5.1965 (Lasse ja Markku Kosonen).

*Plautus alle*. — Loppusyksyn havainto Päijänteen Pulkkilanharjulta 24.10.1965 (Martti Purma ja Matti Seppä).

*Anthus spinoletta*. — Muuttomatalla oleva yks. tavattiin Vääkysssä 15.4.1965 (Martti Purma).

#### Lintuharvinaisuuksia eri puolilta maata

*Podiceps griseigena*. Maassamme varsin harvinaista pesintää merenlahdessa on todettu Taivassalossa, missä kahden munan pesä löytyi Rantalanlahdella 1.6.1967. Myös seur. vuonna linnut olivat paikalla, 27.5. jopa 3 yks. samanaikaisesti näkyvissä (Jouko Laine).

*Podiceps ruficollis*. 13.10.1968 ammuttiin tavina Taivaskosken Kostonjärvellä (Seija Kilpiäinen).

*Fulmarus glacialis*. 30.5.1968 löytyi enintään viikon kuolleena ollut lintu Kemin Rytkarin rannasta (Juhani Jaakkola ym.). Löytö on ainoa maassamme 1960-luvulta.

*Ciconia nigra*. 12.5.1964 nähtiin Pyhtään Heinlahdessa 1 yks. (Urpo Merivalo ja Samuli Koivunen).

*Anas strepera*. Keväällä 1968, 1.5.—20.5., oleskeli 1 pari Lappeenrannan Haapajärvellä (Seppo Löfgren).

*Anser fabalis brachyrhynchus*. 23.4.1967 5 yks. NE Hollolan Paimelanlahdella. Määritys perustui ensi sijassa jalkojen lihanpunertavaan väriin ja siipien vaaleaan etureunaan (J. Kokko).

*Branta leucopsis*. Mielenkiintoinen muuttohavainto Tunturi-Lapista: 14.6.1968 4 yks. N Utsjoen Karigasniemellä (P. Rajala).

*Falco vespertinus*. Kullaan Palusjärvellä nähtiin iltahämärässä hyönteisiä pyydystelevä koiras 6.5.1968 (Usko Jokinen). Kurun Kuusjärvellä tavattiin 27.8. nuori yks., jota saatiin tarkkailla hyvissä olosuhteissa. Tällöin kiintyi huomio juv. linnun parhaaseen tuntomerkkiin, mustahkoon ohjasten, silmänseudun ja lyhyen viikisjuovan muodostamaan, lähes lepinkäismäiseen ”naamariin”, joka erottui selvästi kermanvalkoisesta kurkusta (Pertti Kastari). Päivää myöhemmin (28.8.) nähtiin nuori lintu myös Kustavin Isokarissa, missä havainnoitsijat (Ismo Lahtonen ja Jorma Tenovuuo) kiinnittivät huomiota yllä mainittuun pään erikoistuntomerkkiin. Mainitut havainnot liittyvät lajin poikkeuksellisen runsaaseen esiintymiseen Keski-Euroopan pohjoisosissa syyskesällä 1968.

*Gallinula chloropus*. Kaakkoisrajamme tuntu-massa, Vainikkalan Telkjärvessä asusti pari kesällä 1968. Vehkakasvustosta löytyi 5.6. pesä, 5 munaa, 10.6. munia oli 10 (Seppo Löfgren).

*Tringa stagnatilis*. 16.5.1968 1 yks. W Parraisten Lampisträskin luona (Esa Lehikoinen). Havainto on ainoita muuttavia yksilöitä koskeva maassamme.

*Xenus cinereus*. Lajin pesintä Kemissä on jatkunut (vrt. OF 44, s. 51); v. 1968 pesi 2 paria Veitsiluoto Oy:n makeanvedenltaan äärellä (Juhani Jaakkola ym.).

*Phalaropus fulicarius*. Utsjoen Karigasniemellä, Isosuo lampareissa oleskeli kevätpukuinen naaras 8—9.6.1968. Havainto on ensimmäinen

Lapista ja kolmas sisämaasta (Olavi Hildén ym.).

*Cblidonias niger*. Lajin pesintä Kauvatsan Puurijärvellä näyttää vakiintuneen. V. 1967 tavattiin järvellä kaksi paria, ja toisen 1-munainen pesä löytyi 28.5. (Jorma Laurila ym.). V. 1968 tavattiin yksi pari ja samoin 1-munainen pesä 6.6. (Jouko Hakala ja Esko Tarponen).

*Sterna albifrons*. Siikajokisuu hiekkasaarella ilmoitetaan tavatun 19—20.8.1968 vähintään kuuden parin kolonia, missä emot ruokkivat isokokoisia poikasiaan (Achim Bruch, Berliini). Havainto kaipaa lisävalaistusta.

*Streptopelia turtur*. Pielisjärven Tiensuussa tavattiin lintu perättäisinä syksyinä saman talon pihamaalla: 5—13.10.1965 ja 20—25.9.1966 (Esko Lappi ja Pertti Martiskainen).

*Streptopelia decaocto*. Kristiinan lähistöllä, Pjälaxissa nähtiin yksinäinen lintu 1. ja 5.6. sekä kaupungissa 6.6.1968 (Per Åke Johansson ym.); Kustavin Etelä-Vartsalassa 1 yks. 1.6. 1967 (Pekka Hellström). — Turun ja sen lähiympäristön monet havainnot viime vuosilta jätetään tässä luettelematta.

*Galerida cristata*. Touko—kesäkuun vaihteessa 1960 oleskeli 1 yks. Hartolan Rautarannassa (H. Salo) ja 24.10.1965 nähtiin 1 yks. Heinolan Kaivannossa (Eero Hietanen). Viime vuosilta havaintoja on perin niukalti, 1960-luvulta on näiden ohessa ilmoitettu vain yksi löytö (Pohjolan linnut värikuvin).

*Oriolus oriolus*. 19.6.1968 tavattiin koiras Turun Ruissalon rehevässä tammilehdossa (Kimmo Koponen). Laji on edelleen suuri harvinaisuus etenkin pesimäaikana Turun ympäristössä.

*Saxicola torquata*. 3—6.4.1968 tavattiin värikyksestä päätellen nuori koiras Joensuun Hassanniemen lähistöllä, entisellä kaatopaikka-alueella (Matti Kapanen ja Visa Rauste). Mustapäätasku on vain kerran aiemmin tavattu sisämaassa.

*Phoenicurus ochruros*. Vuodelta 1967 on ilmoitettu pari sisämaahavaintoa: naarasyks. tavattiin Pirkkalan Viholassa 31.3.—1.4. (Jorma Laurila ym.) ja koiras Pellon kk:ssä 30.4.—1.5. (Aimo ja Mirja Komonen).

*Luscinia svecica cyanecula*. Tietävästi vasta toinen havainto nykyisen Suomen alueelta tästä

rodusta tehtiin Parikkalan Siikalahdella 15.5. 1968. Lintu — ad. koiras — saatiin pyydystettyä ja rengastettua (Jorma Sorjonen ja Ismo J. Holopainen).



*Anthus campestris*. Pesi jälleen vuonna 1968 Ruskon lentokentän maastossa (vrt. OF 44, s. 79). Viiden munan pesä löytyi kanervikosta 18.6.; 24.6. pesässä oli 2 pientä poikasta ja 1 muna, 28.6. se oli tyhjä (Jouko Högmänder ja Esa Lehikoinen).

*Lanius minor*. Tämä eteläeurooppalainen harvinaisuus tavattiin 6.7.1968 Vuolijoen Vuotto-lahdessa; puhelinlangalla tähystelevä lintu oli todennäkö. ad. koiras (Pekka Helo).

*Sturnus roseus*. 1—4.9.1967 oleskeli 1 yks. Heinolassa erään kaupunkitalon puutarhassa syöden kirsikoita (A. Bosley).

*Emberiza aureola*. Parikkalan Siikalahdella nähtiin kesällä 1968 kultasirkkuja 11.6.—9.8. välisenä aikana, enimmillään kolme koirasta (20.6.). 4.7. löytyi pesä, joka jäi keskeneräiseksi. Laji on tavattu Siikalahdella ainakin kahtena edellisenä kesänä, mutta naarasta ei aiemmin ole havaittu (Jorma Sorjonen ja Ismo J. Holopainen).

*Emberiza pusilla*. Utsjoen Luomusjoella tavattiin pari kesällä 1968 (naaras havaittiin ensi kerran vasta 8.7.), ja 9.7. löytyi lentokykyinen poikanen (Olavi Hildén ym.). — Samana vuonna nähtiin Joensuun lähistöllä pari muuttomatalla olevaa yksilöä: 29.8. Höytiäisen kanavan suistossa ja 1.9. Hassanniemessä (Matti Kapanen ym.).

*Passer montanus*. Korppoon Utössä tavattiin 2 yks. 8.6.1968 (Jouko Högmänder ym.).