

21 years. Ringed Herring Gulls *Larus a. argentatus* examined in the field were still reproductive at the ages of at least 33, 33, 32 and 29 years.

Selostus: Selkä- ja harmaalokin eliniästä

Kesäkuussa 1979 tappoi suureen ulkohäkkiin päässyt kettu siellä pidetyn selkälokkiparin Wilhelmshavenissa. Lokkiparin koiras oli syntynyt 20.6.1953 hautomiskoneessa Tammisaaren saaristosta otetusta munasta; naaras oli tämän yksilön vankeudessa 1958 syntynyt jälkeläinen. Pari oli pesinyt yhdessä vuodesta 1964 lähtien 11 kertaa, viimeksi 1979, jolloin linnut olivat siis 26 ja 21 vuoden ikäisiä. Rengaslöydöissä vanhin selkälokki on toistaiseksi 26 vuoden ikään elänyt Suomessa merkitty yksilö. Harmaalokin vastaava ikäennätys on lähes 32-vuotiaalla hollantilaisella linnulla. Saksan rannikolla rengastetussa kannassa on kui-

tenkin todettu vielä vanhempia yksilöitä, jotka ovat olleet edelleen lisääntymiskykyisiä vähintään 33, 33, 32 ja 29 vuoden ikäisinä.

Literatur

- AHLQVIST, H. & E. FABRICIUS 1939: Die Vögel des äusseren Schärenhofes zwischen Tvärminne und Jussarö. — *Ornis Fennica* 15:21—32.
- DEHNERT, D. 1972: Ringfunde deutscher Nordsee-Silbermöwen (*Larus argentatus*). Teil 4: Beringungen auf Inseln vor der schleswig-holsteinischen Küste. — *Auspicium* 4:297—412.
- DROST, R., E. FOCKE & G. FREYTAG 1961: Entwicklung und Aufbau einer Population der Silbermöwe (*Larus a. argentatus*). — *J. Ornithol.* 102:404—429.
- RYDZEWSKI, W. 1978: The longevity of ringed birds. — *Ring* 96/97:218—262.

Strange nesting site of a Merlin *Falco columbarius* in Finland

IVAN HILLS

At Karigasniemi (69°25'N), Finnish Lapland, my wife and I found on 26 June 1979 a Merlin's nest in a situation which we understand is sufficiently unusual to be worth putting on record.

The nest, a mere scrape in the ground with a few dead stems of bilberry *Vaccinium myrtillus*, was well concealed under a small juniper at the foot of a birch in a thick wood on a steep east-facing slope. When returning to the nest the incubating bird — the female during our periods of observation — would glide over the tops of the trees, which were some 10 metres high, and then dive down through the canopy, twisting through the trees in a manner reminiscent of a Sparrowhawk *Accipiter nisus*. The nest was surrounded by vegetation except for one side where the brooding bird would have been unable to see further than five metres at the most. When found the nest contained 3 eggs which the female was incubating. About half way through my spell of 4 hours watching and photograph-

ing from a hide within 5 metres the bird appeared to reject one of the eggs which thereafter lay unbrooded outside the nest cup. Next day only 2 eggs remained and there was no sign of the third.

In Britain most Merlins nest on the ground in open moorland or upland pastures, although in a few localities some use an old nest of Carrion Crows *Corvus corone* built in an isolated tree or in a copse. When on the ground the nest is generally well concealed but Merlins nearly always choose a site commanding an extensive field of view.

Selostus: Ampuhaukan erikoinen pesäpalkka

Kirjoittaja löysi Karigasniemellä 26.6.1979 ampuhaukan pesän jyrkän itärinteen tiheästä koivumetsästä. Pesä sijaitti maassa koivun juurella, hyvässä kätkössä katajan alla, ja siitä oli vapaata näköalaa vain yhteen suuntaan, siihenkin enintään 5 m. Neljän tunnin piilokojutarkkailun aikana naaras poisti pesästä yhden kolmesta munasta.